

[illegible]

Agenti eziologici	S	M	L	ASP	U	V	CSF	F	TF	TCL	PENNA	TO	TOC	UA	TN	ESP	TV	TP	LP	LS	TC/RC	L ART	BAL	BIOP	CROSTE	ZECCA
Pneumocystis spp.																							#			
Polyomavirus degli Psittacidi																										
Ricerca e Identificazione funghi																										
Rickettsia spp																										
Theileria equi/ Babesia caballi																										
Toxoplasma gondii																										
Tritrichomonas foetus																										
Wolbachia spp																										

(*) In caso di positività, si può richiedere come ulteriore esame la **GENOTIPIZZAZIONE (sequenziamento diretto)** dell'agente infettivo

(**) Anche lavaggio del colon

(***) E' possibile selezionare uno o più agenti fungini tra M. canis, M. gypseum, T. mentagrophytes, M. persicolor.

Matrice di prima scelta

Legenda intestazione S: sangue, M: midollo, L: aspirato linfonodale, ASP: aspirato (SPL: splenico, EPA: epatico, REN: renale), U: urine, V: versamento, CSF: liquido cefalo rachidiano, F: feci, TF: tampone fecale, TCL: tampone cloacale, TO: tampone orale, TOC: tampone oculo-congiuntivale, UA: umor acqueo, TN: tampone nasale, ESP: espettorato, TV: tampone vaginale, TP: tampone prepuziale, LP: liquido prostatico, LS: liquido seminale, TC: tampone cutaneo, RC: raschiato cutaneo, L ART: liquido articolare, BAL: lavaggio bronco-alveolare, BIOP: biopsia, COLT: colturale, CROSTE, ZECCA