# Prestazioni Erogate dal Laboratorio San Marco

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

| Prestazione | Tipo Esame | Campione | Specie | Accreditato | Quantità | Tempi Refertazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | | | | | | |
| Abiotrofia cerebellare neonatale (NCCD) * Beagle | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Acidi biliari (post prandiali) | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Acidi biliari (pre e post - prandiali) | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml x 2 | in giornata | |
| Acidi biliari (pre prandiali) | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Acidi Biliari normalizzati creatinina | Urine | Urine | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Acidità Titolabile Urinaria (necessari 6 ml di urina) | Urine | Urine | Cane | | 4 ml | in giornata | |
| Acido 3-fenossibenzoico (3-PBA) | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Acido Micofenolico (LC-MS-MS) | Monitoraggio Terapeutico | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 48 ore | |
| Acido Urico | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Acido urico urinario | Urine | Urine | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Aciduria L2 Idrossiglutarica * Staffordshire Bull Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Acrodermatite Letale * Bull Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTH | Endocrinologia | Plasma da sangue intero in $K_3$EDTA addizionato con aprotinina | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | provetta fornita dal laboratorio |
| ACTH (CAVALLO) | Endocrinologia | Plasma da sangue intero in $K_3$EDTA addizionato con aprotinina | Cavallo | | 0.3 ml | in giornata | provetta fornita dal laboratorio |
| Adenovirus respiratorio (CAV2) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Aelurostrongylus abstrusus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Albumine | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Aldosterone sierico LC-MS-MS Accreditato | Endocrinologia | Siero | Gatto |  | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Aldosterone sierico LC-MS-MS pre e post stimolazione con ACTH Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane |  | 0.5 ml x 2 | in 72 ore | |
| Alfa Cloralosio | Tossicologia | | Bovino, Cane, Capra, Cavallo, Furetto, Gatto, Pecora | | | | |
| ALP | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| ALT/GPT | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, | | 0.3 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Furetto, Gatto | | | | |
| Amelogenesi imperfetta (AI) * Akita, American Akita, Italian Greyhound, Parson Russell Terrier (PRT), Samoyed | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Amilasi | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Amilasi urinaria | Urine | Urine | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| ANA test | Immunologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | giovedì | |
| Analisi della razza * (Profilo DNA+attribuzione) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Anaplasma granulocitaria (Anaplasma phagocytophilum) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Anaplasma phagocytophilum/platys | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Angiostrongylus vasorum | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Angiostrongylus vasorum (Antigene) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Antitrombina III | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| APTT | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Arenavirus (Boa/Pitone) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Boa constrictor, Pitone reale | | | 2-5 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspergillus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| AST/GOT | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Atassia Ereditaria * Bobtail, Gordon Setter | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atassia spinocerebellare (SCA) * Jack russell | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atassia Tardiva (LOA) * Jack Russell, Parson Russell Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia muscolare spinale * Maine Coon | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (BAS-PRA) * Basenji | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (Bengal PRA) * Bengala | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (crd1-PRA) * American Staffordshire Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (crd-PRA) * Bassotto a pelo duro | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (GR PRA1) * Golden retriever | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (GR PRA2) * Golden | Genetica | Sangue intero in | Cane | | 0.5 ml o 2 | 2-3 settimane | eseguito in |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retriever | | $K_3$EDTA | | | tamponi buccali | | service |
| Atrofia retinica progressiva (PAP-PRA1) * Papillon, Phalène | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (pd-PRA) * Persiano, Ragdoll, British Shortair, Birmano, Exotic Shortair, Scottish Fold, Selkitk Rex, Blu di Russia, Angora, British Longair, Certosino, Himalaiano | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (PRA forma dominante) * Bull Mastiff, Mastiff inglese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (PRA generalizzata) * Schapendoes | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (PRA Tipo B) * Schnauzer nano | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (prcd-PRA) * CANE tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (rcd1a-PRA) * Sloughi | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (rcd1-PRA) * Setter irlandese, Irish Red e White Sette | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (rcd2-PRA) * Collie, Rough Collie, Smooth Collie | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (rcd3-PRA) * Cardigan Welsh Corgi | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (rcd4-PRA) * Australian Cattle Dog, English Setter, Gordon Setter, Irish | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setter, Irish Red & White Setter,Small Munsterlander and Tibetian Terrier,Miniature Poodle | | | | | buccali | | |
| Atrofia retinica progressiva (rdAc-PRA) * Abissino,Somalo,Ocicat,Siamese,Bengala, Balinese Giavanese,Orientale Shortair, Tonkinese,American curl,Americano pelo ruvido,Himalaiano Shortair,Cornish Rex,Munchkin,Singapura,Peterbald,Seychellois,Thai ) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (rdy-PRA) * Abissino, Somalo, Ocicat | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva (XL-PRA) * Samoyedo, Husky | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva * American Cocker Spaniel, American Eskimo Dog, Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Chesapeake Bay Retriever, Chinese Crested, Entlebucher Mountaindog | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva * Norwegian Elkhound, Cao de Agua Spagnolo, Silky Terrier, Yorkshire Terrier, Markiesje, Finnish Lapphund, Golden Retriever, Kuvasz, Lapponian Herder, Labrador Retriever, Labradoodle, Markiesje | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Atrofia retinica progressiva * Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Cao de Agua Portoghese, English Cocker Spaniel, Swedish Lapphund, Toy Poodle, Poodle, Dwarf Poodle, Norwegian Elkhound, Cao de Agua Spagnolo, Silky Terrier, Yorkshire Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| **B** | | | | | | | |
| Babesia canis (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedi | refertazione in 24 ore |
| Babesia spp. | Biologia | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Molecolare | | | | | | |
| Babesia spp/Cytauxzoon spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Bartonella spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Behaviour Propensity * Pastore Belga Malinois | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Beta-idrossibutirrato (BHB) | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Bicarbonati | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Bifenthrin | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Bilirubina Normalizzata Creatinina | Urine | Urine | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Bilirubina Totale | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Bordetella bronchiseptica | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Borrelia burgdorferi | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Borrelia burgdorferi (IFI) | Sierologico | Siero | Cane, | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Brachiuria * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Braf Mutation * tutte le razze | Genetica | Urine | Cane | | 1 ml di sedimento urinario, urina | 3-4 settimane | Tessuto (da biopsie fissate in formalina, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mattutina per minzione spontanea | | almeno 5 mm), Strisci citologici di FNA ricchi di cellule tumorali o sedimento urinario (almeno 2) - eseguito in service |
| Brodifacoum | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Bromadiolone | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Bromuro di potassio | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.6 ml | venerdì | |
| Brucella canis (agglutinazione) eseguito presso lZSVe * | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 7 giorni | eseguito in service |
| Brucella spp. | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| **C** | | | | | | | |
| Calcio | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Calcio ionico | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | in anaerobiosi |
| Calcio urinario | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Calcoli biliari | Calcoli | Calcoli in provetta vuota | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | | 2-3 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcoli urinari | Calcoli | Calcoli in provetta vuota | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | | 2-3 giorni | |
| Calcolo probabilità di parentela tra 2 fratelli (incl Profilo DNA) * | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | | eseguito in service |
| Calicivirus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Canine Multi-Focal Retinopathy (CMR) * French Bulldog-Australian Shepherd) | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Carbammati | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Carbaril | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Carbofuran | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Cardiomiopatia dilatativa (DCM) * Dobermann | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cardiomiopatia ipertrofica (HCM4) * Sphynx | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cardiomiopatia ipertrofica * Maine Coon A31P | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cardiomiopatia ipertrofica * Ragdoll | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cataratta ereditaria * Staffordshire Bull Terrier, Boston terrier (solo forma precoce), Australian Sheperd Dog, French Bulldog | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catecolamine urinarie (Normetanefrina/Creatinina) (LC-MS-MS) Accreditato | Endocrinologia | Urine | Cane | | 1 ml | in 72 ore | |
| CD4-CD8 | Immunologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 24 ore | |
| CEA (Collie Eye Anomaly) * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cecità notturna (CSNB) * Briard | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cheratocongiuntivite Secca e Dermatosi ittiosiforme (CKCSID) * Cavalier King Charles Spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Chimica Urinaria (Na, K, Cl, Ca, P, Urea, Crea, Acidi biliari) | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 1ml | in giornata | |
| Chlamydophila felis | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Chlamydophila psittaci | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Pappagallo | | | 2-5 giorni | |
| Ciclosporina (LC-MS-MS) | Monitoraggio Terapeutico | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 72 ore | |
| Cimurro | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Furetto | | | 2-5 giorni | |
| Cimurro IgG (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Cimurro IgG e IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Cimurro IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Circovirus degli psittacidi * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Pappagallo | | | 2-5 giorni | o 2 tamponi buccali eseguito in service |
| Cistinuria * Australian Cattle Dog, Bulldog francese, Bulldog inglese, Labrador Retriever, | Genetica | Sangue intero in K | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastiff, Pinscher nano, Terranova | | $_3$EDTA | | | buccali | | |
| Cistinuria Felina * tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Cistoadenocarcinoma ereditario * Pastore tedesco | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Citochimico completo: versamento pleurico, peritoneale e pericardico - Preparati a fresco e fluido in $K_3$EDTA e surnatante ottenuto dopo centrifugazione | Citochimico | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | 1 ml di versamento in $K_3$EDTA, 1 ml di surnatante e strisci a fresco | in giornata | |
| Citologico con citocentrifugazione: cisti cutanee, sottocutanee o da organi interni, BAL, urine, Buffy Coat, articolazioni - Preparati a fresco e fluido in $K_3$EDTA - Per le centesi articolari il costo sarà moltiplicato per n. articolazioni | Citochimico | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | 1 ml di fluido in $K_3$EDTA e strisci a fresco | in giornata | |
| Citopatologico del Midollo Emopoietico | Citopatologia | Vetrini | Cane, Cavallo, Furetto, Gatto | | vetrini | in 24 ore | |
| Citopatologico del Midollo Emopoietico + EMOCROMO (permette agli specialisti di comparare i campioni midollari con il sangue periferico, aspetto fondamentale dell'esame del midollo) | Citopatologia | | Cane, Cavallo, Furetto, Gatto | | 1 ml di sangue in $K_3$EDTA, striscio ematico e strisci di midollo | in 24 ore | |
| Citopatologico fino a 3 distretti (max 10 vetrini) | Citopatologia | Vetrini | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | da 1 a 10 vetrini | in 48 ore | |
| Citopatologico fino a 5 distretti (max 15 vetrini) | Citopatologia | Vetrini | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | da 1 a 15 vetrini | in 48 ore | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citopatologico oltre 5 distretti (e/o oltre 15 vetrini) | Citopatologia | Vetrini | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | da 1 a oltre 15 vetrini | in 48 ore | |
| Citrullina Accreditato | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto |  | 0.5 ml | in 72 ore | |
| CLAD - Canine Leucocyte Adhesion Deficiensy * Setter Irlandese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Clonalità linfoide recettori cellule B e T * cane | Genetica | | Cane | | | 3-4 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per l'analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Clonalità linfoide recettori cellule B e T * gatto | Genetica | | Gatto | | | 3-4 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | l’analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Cloro | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Cloro urinario | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Cobalamina (B12) | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Cobalamina (B12) e Folati | Endocrinologia | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.8 ml | in giornata | |
| Cobalamina (B12), Folati e Citrullina (Cane e Gatto) Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto |  | 1 ml | in 72 ore | |
| Cocoa * (Locus B) Bulldog francese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colesterolo | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, | | 0.5 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gatto | | | | |
| Colinesterasi | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Furetto, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Collie Eye Anomaly (CEA) * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colorazione del pelo Ambra * Norvegese delle foreste | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colorazione del pelo Cannella * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colorazione del pelo variante diluita * tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colorazione pelo Agouti * gatto | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colorazione Pelo Siamese * Burmese-gatto | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colore pelo chinnamon e chocolate * gatto | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colore pelo cioccolato * Labrador | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colore pelo giallo * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colore pelo giallo * Labrador | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore pelo nero * Labrador | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colore pelo variante gold (gene CORIN) * British shortair | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Colturale per aerobi (eSwab®, tampone in gel) | Colturale | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | | in 2-3 giorni | |
| Colturale per aerobi e anaerobi (eSwab®, Bottiglia Bact/Alert® PF plus per altre matrici diverse dal sangue in corso di terapia antibiotica) | Colturale | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | | in 2-3 giorni | in caso di specie a lenta crescita e funghi i tempi potrebbero essere maggiori. |
| Colturale per dermatofiti con identificazione di specie (diagnosi morfologica+PCR) | Colturale | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | peli e/o croste in provetta vuota | in 2 settimane | |
| Condrodistrofia (CDDY) e Condrodisplasia (CDPA) * Tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Coronavirus (FeCoV/FIP) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Coronavirus enterico cane | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Coronavirus respiratorio canino | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Coronavirus/FIP anticorpi (IFI) | Sierologico | Siero | Gatto | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale | Endocrinologia | Siero | Cavallo | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto |  | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post ACTH (due determinazioni) Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane |  | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post ACTH (Terapia con Mitotane) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post ACTH (Terapia con Trilostane) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post ACTH (tre determinazioni) Accreditato | Endocrinologia | Siero | Gatto | | 0.2 ml x 3 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post soppressione con desametasone alte dosi (HDDS) | Endocrinologia | Siero | Cavallo | | 0.2 ml x 3 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post soppressione con desametasone alte dosi (HDDS) Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post soppressione con desametasone basse dosi (LDDS) | Endocrinologia | Siero | Cavallo | | 0.2 ml x 3 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico basale e post soppressione con desametasone basse dosi (LDDS) Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml x 3 | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico post ACTH (Terapia con Trilostane) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Cortisolo LC-MS-MS sierico post stimolazione con ACTH Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Cortisolo sierico basale (metodica immunologica) | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Cortisolo/Creatinina urinari (metodo immunologico) | Endocrinologia | Urine | Cane, Gatto | | 1 ml | in giornata | |
| Cortisolo/Creatinina urinari LC-MS-MS Accreditato | Endocrinologia | Urine | Cane | | 1 ml | in 72 ore | |
| Coumafos | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| CPK | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| CPK CAVALLO | Biochimica Clinica | Siero | Cavallo | | 0.5 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSE (canine prostatic specific esterase) | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Creatinina | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Creatinina urinaria | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Cryptococcus neoformans | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Cryptococcus neoformans (Ricerca antigene + titolazione) | Sierologico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | entro 15 giorni | |
| Cryptococcus neoformans (Ricerca antigene neg/pos) | Sierologico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | entro 15 giorni | |
| Cryptosporidium spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo, Coniglio, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Cumaclor | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Cumatetralil | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Curly coat * cane | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Curva glicemica (costo riferito a singola determinazione) | Referto Generico | siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml x ogni singola determinazione | in giornata | |
| Cypermethrin | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| **D** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Dimeri | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane | | 0.3 ml | in giornata | |
| Deficienza del Fattore VII * Alaskan Klee Kai, Scottish Deerhound, Beagle, Schnauzer Gigante | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Deficienza del fattore XI (F11) * Maine coon | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Deficienza di fosfofruttochinasi (PFK) * English Springer Spaniel, American Cocker Spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Deficienza di piruvato chinasi (PK) * Cani e Gatti varie razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Deficit della piruvato deidrogenasi (PDP1)* Clumber, Sussex Spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Deltamethrin | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Dental skeletal retinal anomaly (DSRA) * Corso | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Deposito campione biologico * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Dermatomiosite (DMS) * Collie, Rough Collie, Shetland Sheepdog, Smooth Collie | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Determinazione gruppo sanguigno | Immunologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Diazinon | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difacinone | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Difenacoum | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Difetialone | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Difetto del gene MDR1 * Angora, Balinese, Maine Coon, Ragdoll, Blu di Russia, Siamese, Europeo | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Digital Hyperkeratosis (DH) * Dogue de Bordeaux, Irish Terrier, Kromfohrlander | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Digossina | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Digossina (doppia determinazione per terapia) | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml x 2 | in giornata | |
| Diluizione del colore del pelo * CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Diluizione del colore del pelo * GATTO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Dirofilaria immitis | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Dirofilaria immitis ricerca antigene (ELISA) | Sierologico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 24 ore |
| Dirofilaria immitis ricerca antigene urgente (POC) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Dirofilaria repens | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Discinesia ciliare primaria (PCD) * Bobtail | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 3-4 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | buccali | | |
| Displasia retinica (OSD) * Labrador Retriver, Samoiedo | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Distrofia muscolare * Golden Retriever, Cavalier King Charles Spaniel, Epagneul Breton | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Dominant White * White Spotting | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Doramectina | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| **E** | | | | | | | |
| Ehrlichia canis (CME) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Ehrlichia canis (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si eseguie il martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Elettroforesi | Elettroforesi Sierica | Siero | Asino, Cane, Cavallo, Coniglio, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Emocoltura (Bottiglia Bact/Alert®, sangue) | Colturale | Sangue in terreno di coltura | Cane, Gatto | | da 1 ml a 4 ml | 1-7 giorni | Bottiglia fornita dal laboratorio. La refertazione è immediata in caso di positività e dopo 6 giorni in caso di negatività |
| Emocromo | Ematologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Furetto | | 1 ml | in giornata | |
| Emocromo AVIARIE | Ematologia | Sangue intero in | Aviarie | | 1 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | litio eparina | | | | | |
| Emocromo CONIGLIO | Ematologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Coniglio | | 1 ml | in giornata | |
| Emocromo GATTO-CAVALLO-ASINO | Ematologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Asino, Cavallo, Gatto | | 1 ml | in giornata | |
| Emocromo TARTARUGA | Ematologia | Sangue intero in litio eparina | Tartaruga | | 1 ml | in giornata | |
| Emofilia A * (carenza del fattoreVIII) Bichon Havanese, Boxer , German Shepherd , Labrador Retriever , Old English Sheepdog (Bobtail) , Pastore tedesco, Rhodesian Ridgeback | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Emofilia B * (carenza del fattore IX) Rhodesian Ridgeback | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Emoglobina glicata | Biochimica Clinica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 1 ml | in giornata | |
| Encefalopatia neonatale * Barbone gigante | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Encephalitozoon cuniculi | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Coniglio, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Encephalopathy * Alaskan Husky | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Epatite infettiva di Rubarth (CAV1) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Epidermolisi bollosa giunzionale * Pointer, Bracco tedesco | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Epileptic encephalopathy * Bengala | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Epilessia Giovanile * Lagotto Romagnolo | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | buccali | | |
| Estradiolo 17 ß LC-MS-MS | Endocrinologia | Siero | Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Estradiolo 17 ß LC-MS-MS (Femmina-Castrata-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Estradiolo 17 ß LC-MS-MS (Femmina-Intera-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Estradiolo 17 ß LC-MS-MS (Maschio-Castrato-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Estradiolo 17 ß LC-MS-MS (Maschio-Intero-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Estradiolo e estradiolo post stimolazione LC-MS-MS (Femmina-Castrata-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| Estradiolo e estradiolo post stimolazione LC-MS-MS (Femmina-Intera-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| Estradiolo e estradiolo post stimolazione LC-MS-MS (Maschio-Castrato-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| Estradiolo e estradiolo post stimolazione LC-MS-MS (Maschio-Intero-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml x 2 | in 72 ore | |
| **F** | | | | | | | |
| Fattore di Von Willebrand | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Fattore II | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| Fattore IX | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| Fattore V | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| Fattore VII | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| Fattore VIII | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| Fattore X | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattore XI | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| Fattore XII | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 15 giorni | |
| FDP (quantitativo) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Febbre dello Shar Pei (Spaid) * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| FELV (Ag) - FIV (Ab) - Dirofilaria immitis (Ag) [POC] | Sierologico | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| FeLV (ricerca del Provirus) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2.5 giorni | |
| FeLV (ricerca RNA virale) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| FELV ricerca anticorpi (POC) | Sierologico | Siero | Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| FELV-FIV (ELISA) | Sierologico | Siero | Gatto | | 0.5 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 24 ore |
| FELV-FIV urgente (POC) | Sierologico | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Fenobarbital (LC-MS-MS) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto |  | 0.3 ml | in 72 ore | |
| Fenobarbital LC-MS-MS (doppia determinazione per terapia) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto |  | 0.3 ml x 2 | in 72 ore | |
| Ferritina | Biochimica Clinica | Siero | Cane | | 0.2 ml | in giornata | |
| Ferro totale | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Fibrinogeno | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIV | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Flocoumafen | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Flottazione in Sodio-Cloruro (Mini-FLOTAC) | Coprologico | Feci | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | 4 gr | 24 ore | |
| Flottazione in Soluzione Zuccherina (Mini-FLOTAC) | Coprologico | Feci | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | 4 gr | 24 ore | |
| Flottazione in Zinco-Solfato (Mini-FLOTAC) | Coprologico | Feci | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | 4 gr | 24 ore | |
| Flumethrin | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Folati | Endocrinologia | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Fosforo | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Fosforo urinario | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Fruttosamina | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Coniglio, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| FT4 (LC-MS-MS) - TT4 | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT4 (LC-MS-MS) - TT4 - TSH | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| FT4 LC-MS-MS | Endocrinologia | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in 72 ore | |
| FT4(LC-MS-MS) | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 72 ore | |
| FT4(lc-ms-ms) - TSH | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| FT4(LC-MS-MS) (doppia determinazione per terapia) | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml x 2 | in 72 ore | |
| FT4(lc-ms-ms)-FT4(lc-ms-ms) post TRH | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.3 ml x 2 | in 72 ore | |
| FT4(lc-ms-ms)-TSH | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Fukosidosi * English Springer Spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Furnishing * CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| **G** | | | | | | | |
| Gangliosidosi GM1 * Burmese, Domestic Shorthair, Siamese, Korat | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Gangliosidosi GM1 * Husky, Cao de Agua portoghese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Gangliosidosi GM2 * Burmese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Gangliosidosi GM2 * Domestic Shorthair | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Gangliosidosi GM2 * Japanese Shorthair | Genetica | Sangue intero in | Gatto | | 0.5 ml o 2 | 2-3 settimane | eseguito in |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $K_3$EDTA | | | tamponi buccali | | service |
| Gangliosidosi Tipo1 GM1 * Shiba Inu | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Gastrina (cane) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.2 ml | in giornata | |
| Genotipizzazione (Sequenziamento diretto): Babesia spp * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo | | | 10 giorni | eseguito in service |
| Genotipizzazione (Sequenziamento diretto): Babesia spp/Cytauxzoon spp * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 10 giorni | eseguito in service |
| Genotipizzazione (Sequenziamento diretto): Giardia spp * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 10 giorni | eseguito in service |
| Genotipizzazione (sequenziamento diretto): Parvovirosi (cane) * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 10 giorni | eseguito in service |
| Genotipizzazione (sequenziamento diretto): Parvovirosi (gatto)* | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 10 giorni | eseguito in service |
| GGT | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| GGT Normalizzata Creatinina | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| GGT urinaria | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Giardia spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Giardia/Cryptosporidium (IFA) | Coprologico | | Cane, Gatto | | | | |
| Glaucoma primario ad angolo aperto (POAG) * Beagle e Basset hound | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Glicogenosi (GSD) * di tipo IV Norvegese delle | Genetica | Sangue intero in | Gatto | | 0.5 ml o 2 | 2-3 settimane | eseguito in |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreste | | $K_3$EDTA | | | tamponi buccali | | service |
| Glicogenosi (GSD) * Tipo Ia CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Glicogenosi (GSD) * Tipo IIIa Curly Coated Retriever | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Glicole Etilenico | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero o urina |
| Glucosio | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Glucosio/Creatinina | Urine | Urine | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Goniodysgenesis and Glaucoma * Border Collie | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| GS-441524 (LC-MS-MS) | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Gatto | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| **H** | | | | | | | |
| Hairlessness * (Cane nudo) Chinese Crested, Mexican Hairless e Peruan Hairless | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Hepadnavirus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Hepatozoon spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Herpes virus (tartaruga) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Tartaruga | | | 2-5 giorni | |
| Herpes virus equino tipo 1 (EHV1) * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cavallo | | | 7 giorni | eseguito in service |
| Herpes virus equino tipo 4 (EHV4) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cavallo | | | 2-5 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herpesvirus cane | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Herpesvirus canino (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Herpesvirus gatto | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| HPT aptoglobina | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Hypomyelination (Shaking Puppy Syndrome) SPS - Weimaraner * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| **I** | | | | | | | |
| Ibridazione in situ per Escherichia coli | Istopatologia | | Cane | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Ibridazione in situ per Herpes felino tipo 1 (FHV-1) | Istopatologia Cutanea | | Gatto | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Ibridazione in situ per Herpesvirus felino tipo 1 (FHV-1) | Istopatologia | | Gatto | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Ibridazione in situ per Papilloma virus felino di tipo 2 (FcaPV-2) | Istopatologia Cutanea | | Gatto | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Ibridazione in situ per Papillomavirus felino di tipo 2 (FcaPV-2) | Istopatologia | | Gatto | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Ibridazione in situ per Parvovirus canino | Istopatologia | | Cane | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| IGA | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| IgF-1 | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| IGG | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| IGM | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Imerslund Grasbeck Syndrome (IGS) * Beagle e Border Collie | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 2 - 3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | buccali | | |
| Immunocitopatologia pannello istiocitarie cane (citologia esclusa) - contattare il Laboratorio per scelta e costo anticorpi | Citopatologia | Vetrini non colorati | Cane | | | in 72 ore | |
| Immunocitopatologia pannello istiocitarie gatto (citologia esclusa) - contattare il Laboratorio per scelta e costo anticorpi | Citopatologia | Vetrini non colorati | Gatto | | | in 72 ore | |
| Immunocitopatologia pannello linfoidi (citologia esclusa) - CD3, CD79 | Citopatologia | Vetrini non colorati | Cane, Cavallo, Gatto | | | in 72 ore | |
| Immunocitopatologia specifica (citologia esclusa) per singolo anticorpo | Citopatologia | Vetrini non colorati | Cane, Cavallo, Gatto | | | in 72 ore | |
| Immunofenotipo (da tessuti vari) | Immunologia | provette per immunofenotipo linfonodale | Cane, Gatto | | 2 provette fornite dal laboratorio | in 24 ore | creare una sospensione cellulare utilizzando le provette fornite dal laboratorio per l'immunofenotipo linfonodale. Nel caso di campioni fortemente contaminati da sangue (es. milza) è possibile dispensare due provette per immunofenotipo linfonodale su una con $K_3$EDTA e procedere al prelievo come di consueto eseguibile entro |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo anti IgG-IgM PLT | Immunologia | Sangue intero in sodio citrato | Cane, Gatto | | 3.5 ml di sangue intero in sodio citrato | in 24 ore | eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo anti IgG-IgM RBC | Immunologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 24 ore | eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo ematologico | Immunologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 1 ml | in 24 ore | eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo linfonodale | Immunologia | provette per immunofenotipo linfonodale | Cane, Gatto | | si consiglia 3 provette fornite dal laboratorio | in 24 ore | Sospensione di cellule linfonodali, ottenuto per ago-infissione e utilizzando l'apposita provetta fornita dal Laboratorio, eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo midollare | Immunologia | Succo midollare in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml di succo midollare in $K_3$EDTA | in 24 ore | eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo Sindrome di Bernard-Soulier/Tromboastenia di Glanzmann | Immunologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 1 ml | in 24 ore | eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunofenotipo su versamento cavitario | Immunologia | Versamento in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | da 0.5 a 10 ml | in 24 ore | eseguibile entro 48 ore dal prelievo |
| Immunoistochimica per neoplasie (singolo anticorpo) | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica per neoplasie (singolo anticorpo) | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunoistochimica: Leiomiosarcoma vs GIST | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Leishmania - Papillomavirus (cane) - Parvovirus - Coronavirus Felini e altri | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Leishmania-Papillomavirus (cane)-Parvovirus-Coronavirus Felini e altri | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Mastocitoma (Ag NOR, Ki67, CD117) | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Mastocitoma (Ag NOR, Ki67, CD117) | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia di origine linfoide | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia di origine linfoide | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia epiteliale / epiteliale ghiandolare | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia epiteliale / epiteliale ghiandolare | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia indifferenziata maligna | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia indifferenziata maligna | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia neuroendocrina - neuroepiteliale | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia neuroendocrina - neuroepiteliale | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia rotondo cellulare | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia rotondo cellulare | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia surrenalica (Vimentina, sinaptofisina, cromogranina) | Istopatologia | | Cane, Cavallo, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Neoplasia tiroidea | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunoistochimica: Sarcoma vs Melanoma | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Sarcoma vs Melanoma | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Sarcomi dei tessuti molli (PNST, tumori perivascolari, fibrosarcoma) | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Sarcomi dei tessuti molli (PNST, tumori perivascolari, fibrosarcoma) | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Sarcomi muscolari | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Sarcomi scarsamente differenziati | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoistochimica: Sarcomi scarsamente differenziati (muscolare vs endoteliale vs istiocitario) | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 10 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Immunoterapia Nextmune Allergene Specifica Sottocutanea (1-4 Allergeni)* | Immunologia | | Cane, Cavallo, Gatto | | | 3-4 settimane | richiesta aggiuntiva |
| Immunoterapia Nextmune Allergene Specifica Sottocutanea (5-8 Allergeni)* | Immunologia | | Cane, Cavallo, Gatto | | | 3-4 settimane | richiesta aggiuntiva |
| Improper Coat * Cao de Agua Protoghese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Insulina | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 24 ore | |
| Ipertermia maligna (MH) * tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Iperuricosuria (SLC) * tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Ipokaliemia * Burmese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Ipoplasia cerebellare (CH) * Pastore svizzero bianco | Genetica | Sangue intero in | Cane | | 0.5 ml o 2 | 2-3 settimane | eseguito in |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $K_3EDTA$ | | | tamponi buccali | | service |
| Ipotiroidismo * Fox terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Ipotiroidismo congenito (CHG) * Cao de Agua spagnolo | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Ipotiroidismo congenito (TPO) * tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Istologia cutanea con colorazioni speciali (Istologico + PAS/Grocott, Ziehl Neelsen, Gram) | Istopatologia Cutanea | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 10 giorni lavorativi | |
| Istologia epatica con colorazioni speciali (tricromica, reticolina e rodanina) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 10 giorni lavorativi | |
| Istologia per sospetto mastocitoma con valutazione dei margini e con linfonodo (giemsa su linfonodo) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologia renale con colorazioni speciali (PAS, Tricromica, PASM) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 10 giorni lavorativi | |
| Istologico (da 1 a 3 sedi anatomiche) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico (da 1 a 3 sedi anatomiche) con valutazione dei margini di 1 neoformazione | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico biopsie gastro-intestinali + | Istopatologia | campione in | Cane, | | campione in | 10 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| immunoistochimica pannello enteropatia (enterite vs linfoma) | | formaina | Cavallo, Gatto e altre specie | | formalina | lavorativi | |
| Istologico con valutazione dei margini | Istopatologia Cutanea | campione in formaina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico con valutazione dei margini da 4 neoformazioni | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico con valutazione dei margini di 2 neoformazioni | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico con valutazione dei margini di 3 neoformazioni | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico da più di 3 sedi (esclusi campionamenti endoscopici e biopsie cutanee) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico di fila mammaria completa (almeno una sezione per ogni mammella, neoformazioni e linfonodi annessi) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico di fila mammaria completa con valutazione dei margini (almeno una sezione per ogni mammella, neoformazioni e linfonodi annessi) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico per biopsie cutanee | Istopatologia Cutanea | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Istologico Seconda Opinione: solo lettura istologica | Istopatologia | | Cane, | | | 7 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di vetrini istologici già colorati o da colorare con Ematossilina Eosina | | | Cavallo, Gatto e altre specie | | | lavorativi | |
| Istopatologico - processazione rapida (PRIMA AVVISARE IL LABORATORIO, verrà refertato entro le 19.30 del giorno di arrivo) | Istopatologia | campione in formalina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | campione in formalina | in giornata | Disponibile per campionamenti bioptici di piccole dimensioni (2mm di spessore). Non disponibile per campioni ossei o calcificati o di grandi dimensioni |
| Ittiosi * American Bulldog | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Ittiosi * Golden retriever | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Ivermectina | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| **J** | | | | | | | |
| Juvenile Laryngeal Paralysis and polyneuropathy (JLPP) * Black Russian terrier, Rottweiler | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME) * Rhodesian Ridgeback | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| **L** | | | | | | | |
| Lafora Disease * Beagle, Basset Hound, Chihuahua, Dachshund | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lagotto Storage Disease (LSD) * Lagotto romagnolo | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laryngeal Paralysis (LP) * Bull Terrier, Miniature Bull Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Laryngeal Paralysis Polyneuropathy (LPPN3) * Labrador Retriever, Leonbergher, San Bernardo | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lattato | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Lattoni macrociclici | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | |
| LDH | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Leishmania Ig (ELISA) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 72 ore | |
| Leishmania IgG (IFI) Accreditato | Sierologico | Siero | Cane | | 0.2 ml | in 7 giorni | |
| Leishmania IgG (IFI) gatto | Sierologico | Siero | Gatto | | 0.2 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Leishmania infantum | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Leptospira interrogans | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Cavallo, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Leucodistrofia globoide/Malattia di Krabbe * West Highland White Terrier, Cairn Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Levetiracetam (LC-MS-MS) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in 72 ore | |
| Lipasi | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, | | 0.2 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Furetto, Gatto | | | | |
| Lipasi (DGGR) | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| Lipasi urinaria | Urine | Urine | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Lipofuscinosi ceroide neuronale (CL/NCL)* American Bulldog,Border Collie,Cane Corso (Ita),Chihuahua, Chinese Crested,English Setter,Golden Retriever,Goldendoodle,Gordon Setter,Saluki,Schapendoes(Dutch Sheep Dog),Small Swiss Hound,Tibetan Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lipofuscinosi ceroide neuronale (NCL COMBI)* Australian Cattle Dog,Australian Shepherd,Dachshund (Min.Wire haired,Min.Long Haired,Min.Smooth Haired,Standard Long Haired,Standard Smooth Haired,Standard Wirehaired),Miniature American Shepherd | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lipofuscinosi ceroide neuronale * American Staffordshire Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus A * Agouti (Allele Y, TAN, NON AGOUTI) CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus B * (colore marrone) CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus K * CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus E * (Colore pelo Giallo, Albicocca…) CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus EG * (Domino, Grizzle) Saluki, Afgano | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locus EH * (marrone) English Cocker Spanie | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus EM * (Melanistic Mask Allele) CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus Merle * (cane tutte le razze) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Locus S * razze su richiesta | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lunghezza pelo * cane | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lunghezza pelo * gatto | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Lussazione del Cristallino * CANE varie razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| **M** | | | | | | | |
| Macrothrombocytopenia (MTC-D) * Bichon Frise,Boxer,Cavalier King Charles Spaniel,Chihuahua,Cocker Spaniel,Dwarf poodle,Havanese,Jack Russel Terrier,Labrador Retriever,Maltese,Poodle,Shih Tzu | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Macrothrombocytopenia * Cairn Terrier, Norfolk Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Magnesio | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malattia Aleutina del furetto * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Furetto | | | 2-5 giorni | o 2 tamponi buccali eseguito in service |
| Malattia da accumulo di rame * Dobermann, Labrador Retriever | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Malattia da accumulo di rame * BedlingtonTerrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Malattia di Pacheco * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Pappagallo | | | 2-5 giorni | o 2 tamponi buccali eseguito in service |
| Malattia di Von Willebrand tipo I * Tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Malattia di Von Willebrand tipo II * Deutsch Drahthaar, German Shorhaired Pointer, German Wirehaired Pointer | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Malattia di Von Willebrand tipo III * Scottish Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Malattia di Von Willebrand tipo III * Shetland Sheepdog | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Mannosidosi * Persiano | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Mantello Tobiano * CAVALLO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cavallo | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Meningoencefalite necrosante (PDE) * Carlino | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Metaldeide | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, | | 0.2 ml | in 48 ore | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gatto | | | | |
| Methamidophos | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Methomyl | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Micoplasmi emotropici felini (Mycoplasma haemofelis,Candidatus haemominutum,Candidatus turicensis) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Microbioma Fecale Sequenziamento (esame di controllo con report comparativo) * | Coprologico | Feci | Cane, Gatto | | tampone apposito | 4-6 settimane | eseguito in service |
| Microbioma Fecale Sequenziamento * | Coprologico | Feci | Cane, Gatto | | tampone apposito | 4-6 settimane | eseguito in service |
| Mielopatia degenerativa Esone 1 * Bovaro del Bernese | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Mielopatia degenerativa Esone 2 Tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 5 giorni | |
| Milbemicina | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero |
| Mioglobinuria | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 5 ml | in giornata | solo in urine scure |
| Miopatia ereditaria CNM * (Centronuclear Myopathy) Labrador | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Miotonia congenita * Cani: Australian Cattle Dog, Labrador Retriever, Schnauzer nano; Gatti: tutte le razze | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Mucopolisaccaridosi VI (MPS) * Cani: Miniature Pinscher; Gatti: Siamese, gatto comune | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Mucopolisaccaridosi VII (MPS) * Cani: Pastore | Genetica | Sangue intero in | Cane, | | 0.5 ml o 2 | 2-3 settimane | eseguito in |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tedesco; Gatti: gatto comune | | $K_3$EDTA | Gatto | | tamponi buccali | | service |
| Mutazione della miostatina Bully Gene * Whippet | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Mutazioni ins del ITD puntiformi recettore c-kit mastocitoma felino esone 11 (ITD, inserzioniedelezioni) * | Genetica | | Gatto | | | 2-3 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per l'analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Mutazioni ins del ITD puntiformi recettore c-kit mastocitoma felino esone 8 (ITD, inserzioniedelezioni) * | Genetica | | Gatto | | | 2-3 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per l'analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Mutazioni ins del ITD puntiformi recettore c-kit mastocitoma felino esone 9 (ITD, inserzioniedelezioni) * | Genetica | | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per l'analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Mycoplasma cynos | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Mycoplasma felis (vie respiratorie, gatto) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Mycoplasma haemocanis (canino) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycoplasma spp. | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Pappagallo, Tartaruga | | | 2-5 giorni | |
| Mycoplasma spp. (vie genitali) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Mycoplasma spp. (vie respiratorie e genitali) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| **N** | | | | | | | |
| Nanismo (SD2) * Labrador | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Nanismo ipofisario * Lupo cecoslovacco, Pastore tedesco | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Narcolessia * Dobermann, Labrador Retriever | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Nefropatia ereditaria * English Cocker Spaniel, English Springer Spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Nefropatia policistica * Persiano e razze collegate | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Neonatal Cerebellar Cortical Degeneration * Beagle | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Neospora caninum | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Neospora caninum IgG (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Neospora caninum IgG e IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Neospora caninum IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | si esegue il giovedì | refertazione in 24 ore |
| Neuropatia ereditaria * Greyhound | Genetica | Sangue intero in | Cane | | 0.5 ml o 2 | 2-3 settimane | eseguito in |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $K_3EDTA$ | | | tamponi buccali | | service |
| Nidovirus (Boa/Pitone) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Boa constrictor, Pitone reale | | | 2-5 giorni | |
| **O** | | | | | | | |
| Organi da necroscopia | Istopatologia | campioni in formalina | Cane, Cavallo, Gatto | | campione in formalina | 7 giorni lavorativi | |
| Organofosforici sangue | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | |
| Organofosforici sangue + urine | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ + urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml di sangue $K_3EDTA$ + 1 ml di urina | in 48 ore | |
| Organofosforici urine | Tossicologia | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 1 ml | in 48 ore | |
| Ormone Anti-Mulleriano * | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | 7 giorni | eseguito in service |
| Ormoni sessuali CANE LC-MS-MS (Femmina Castrata Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Ormoni sessuali CANE LC-MS-MS (Femmina Intera Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Ormoni sessuali CANE LC-MS-MS (Maschio Castrato Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Ormoni sessuali CANE LC-MS-MS (Maschio Intero Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Ormoni sessuali maschili/femminili LC-MS-MS | Endocrinologia | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Osmolalita' sierica misurata | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, | | 0.5 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Furetto, Gatto | | | | |
| Osmolalità urinaria | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Osteocondrodisplasia * Scottish fold | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Osteogenesi imperfetta * Bassotto a pelo corto/ruvido | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Osteopatia craniomandibolare * Cairn terrie, Scottish terrie, West Highland white terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Overo Lethal White Foal Syndrome (OLWS) * CAVALLO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cavallo | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| **P** | | | | | | | |
| Pacchetto Barbone toy * (Degenerative myelopathy (DM exon 2), Neonatal encephalopathy with seizures (NEWS), Progressive retinal atrophy (prcd-PRA), Progressive retinal atrophy (rcd4-PRA), Von Willebrand disease type I (vWD1) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Pacchetto Cavalier King Charles Spaniel B * (EF Episodic Falling, CCS Dry Eye, MCAD, MMVD Myxomatous mitral valve disease, MTC-D Macrothrombocytopenia) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Pacchetto colori del mantello per il Bulldog Francese * (Locus: A+B+D1+E1+I+K+S) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Pacchetto combinazioni colore del pelo del gatto * (Agouti, Burmese, Cioccolato, Cannella, Diluizione, Siamese) (Laboklin) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Pacchetto Golden Retriever * (Atrofia Retinica Progressiva GR-PRA1 GR-PRA2 prcd-PRA, Ittiosi | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 3-4 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH, Distrofia Muscolare MD, Lipofuscinosi Ceroide Neuronale CL/NCL) | | | | | buccali | | |
| Pacchetto malattie genetiche per Australian Shepherd * (CEA, Mielopatia degenerativa, Cataratta ereditaria, MDR1, Ipertermia maligna, Lipofuscinosi ceroide neuronale, Atrofia retinica progressiva) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Pacchetto Miniature American Shepherd, Australian Shepherd * (Collie Eye Anomaly (CEA), Degenerative Myelopathy, Hereditary Cataract (HSF4), MDR1, Brachyury, Progressive Retinal Atrophy (prcd-PRA), Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Hyperuricosuria) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Panel Coagulativo (II-V-VII-VIII-IX-X-XI-XII) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in 15 giorni | |
| Panleucopenia (Parvovirus felino) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Pannelli colorazioni speciali (da richiedere dopo esame istopatologico) | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Pannelli colorazioni speciali da 2 a 4 (da richiedere dopo esame istopatologico) | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| PANNELLO DERMATOFITI (Microsporum canis-Microsporum gypseum-Tricophyton mentagrophytes-Microsporum persicolor) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2.5 giorni | |
| PANNELLO DIROFILARIA (Dirofilaria immitis-Dirofilaria repens) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| PANNELLO FECALE CANE (Coronavirus-Cryptosporidium-Giardia-Parvovirus) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| PANNELLO FECALE GATTO (Coronavirus-Cryptosporidium-Giardia-Parvovirus-Tritrichomonas) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| PANNELLO LIQUOR (Cimurro-Toxoplasma-Neospora-Leishmania) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| PANNELLO LIQUOR (Toxoplasma-Neospora-Coronavirus-Parvovirus) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANNELLO MALATTIE DA VETTORI: Anaplasma (platys-phagocytophilum)-Ehrlichia-Rickettia-Babesia-Leishmania-Bartonella-Hepatozoon | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| PANNELLO MALATTIE DA VETTORI: Micoplasmi emotropici felini (Mycoplasma haemofelis,Candidatus haemominutum,Candidatus turicensis)-Cytauxzoon-Babesia-Bartonella-Leishmania | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Pannello mutazioni recettore c-kit mastocitoma canino esone 11 * | Genetica | | Cane | | | 3-4 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per l'analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Pannello mutazioni recettore c-kit mastocitoma canino esoni 8, 9, 11, 14, 17 * | Genetica | | Cane | | | 3-4 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l'infissione per |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | l’analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| Pannello recettore c-kit mastocitoma felino esoni 8, 9, 11 * | Genetica | | Gatto | | | 3-4 settimane | Striscio su campione portaoggetto fissato e colorato, ago con cui è stata eseguita l’infissione per l’analisi citologica dopo averlo innestato alla siringa, biopsie tissutali fresche in soluzione fisiologica o secche, campioni in formalina/tessuti in blocchetto - eseguito in service |
| PANNELLO RESPIRATORIO (Calicivirus-Herpes virus-Chlamydia felis-Bordetella-Aelurostrongylus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto | | | 2-5 giorni | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abstrusus- Mycoplasma felis) | | | | | | | |
| PANNELLO RESPIRATORIO (Cimurro-Bordetella-Parainfluenza-CAV2-Coronavirus respiratorio canino-Angiostrongilosi-Mycoplasma cynos) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Pannello tossicologico [sangue] | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | |
| Pannello tossicologico Plus [sangue + urine] | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA + urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml di sangue $K_3$EDTA + 1 ml di urine | in 48 ore | |
| Papilloma virus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Papilloma virus bovino * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Bovino | | | 2-5 giorni | o 2 tamponi buccali eseguito in service |
| Paracheratosi Nasale Ereditaria (HNPK) * Labrador Retriever | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Parainfluenza Virus (CPiV) | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Paralisi Periodica Iperkaliemica (HYPP) * CAVALLO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cavallo | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Parathion | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Paroxysmal Dyskinesia (PxD) * Soft Coated Wheaten Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Parvovirus | Coprologico | Feci | Cane, Gatto | | 5 gr | in giornata | |
| Parvovirus cane | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane | | | 2-5 giorni | |
| Permethrin | Tossicologia | Sangue intero in | Cane, | | 0.2 ml | in 48 ore | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $K_3EDTA$ | Gatto | | | | |
| Peso Specifico | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Piperonyl butosside | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Piretroidi | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | |
| Pirimiphos methyl | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Pneumocystis spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Polineuropatia * Alaskan Malamute | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Polineuropatia di tipo 1 (LPN1) * Leonberger | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Polineuropatia di tipo 2 (LPN2) * Leonberger | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Polyomavirus degli psittacidi * | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Pappagallo | | | 2-5 giorni | o 2 tamponi buccali eseguito in service |
| PON-1 | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Coniglio, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Potassio | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Potassio urinario | Urine | Urine | Cane, | | 0.5 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cavallo, Gatto | | | | |
| Prekallikrein Deficiency (KLK) * Shih Tzu | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| PROFILO A: CONIGLIO Emo - Bio - EE | Profili | | Coniglio | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero | in giornata | |
| PROFILO A: Emo - Bio - EE | Profili | | Cane | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero | in giornata | |
| PROFILO A: GATTO-CAVALLO-ASINO Emo - Bio - EE | Profili | | Asino, Cavallo, Gatto | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero | in giornata | |
| PROFILO A: PAPPAGALLO Emo - Bio - EE | Profili | | Pappagallo | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero | in giornata | |
| PROFILO A: TARTARUGA Emo - Bio - EE | Profili | | Tartaruga | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero | in giornata | |
| PROFILO B: Emo - Bio - EE - Urine Estese | Profili | | Cane | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero + 8 ml urine | in giornata | |
| PROFILO B: GATTO-CAVALLO-ASINO Emo - Bio - EE - Urine Estese | Profili | | Asino, Cavallo, Gatto | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero + 8 ml urine | in giornata | |
| Profilo Biochimico Standard (Cane) | Biochimica Clinica | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo Biochimico Standard (Capra) | Biochimica Clinica | Siero | Capra | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo Biochimico Standard (Cavallo) | Biochimica Clinica | Siero | Cavallo | | 0.5 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilo Biochimico Standard (Coniglio) | Biochimica Clinica | Siero | Coniglio | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo Biochimico Standard (Gatto) | Biochimica Clinica | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo Biochimico Standard (Pappagallo) | Biochimica Clinica | Siero | Pappagallo | | 0.5 ml | in giornata | |
| PROFILO C: Emo - Bio - EE - Coag | Profili | | Cane | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero + 0.5 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| PROFILO C: GATTO-CAVALLO-ASINO Emo - Bio - EE - Coag | Profili | | Asino, Cavallo, Gatto | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.5 ml siero + 0.5 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| Profilo coagulativo di base (CANE: aPTT-PT-Fib-AT-DD-FDP) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo coagulativo di base (CAVALLO) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cavallo | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo coagulativo di base (GATTO e ALTRE SPECIE) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| PROFILO D: ASINO-CAVALLO Emo - Ret - Bio - EE - Urine Estese - Coag | Profili | | Asino, Cavallo | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.8 ml siero + 8 ml urine + 0.5 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| PROFILO D: Emo - Ret - Bio - EE - Urine Estese - Coag | Profili | | Cane | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.8 ml siero + 8 ml urine + 0.5 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| PROFILO D: GATTO Emo - Ret - Bio - EE - Urine | Profili | | Gatto | | 1 ml sangue | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estese - Coag | | | | | $K_3$EDTA + 0.8 ml siero + 8 ml urine + 0.5 ml plasma da sodio citrato | | |
| PROFILO E: CAVALLO Emo - Ret - Bio - EE - Urine Estese - Coag | Profili | | Cavallo | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.8 ml siero + 8 ml urine + 0.5 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| PROFILO E: Emo - Ret - Bio - EE - Urine Estese - Coag | Profili | | Cane | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.8 ml siero + 8 ml urine + 0.5 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| Profilo Genetico Forense * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Profilo genetico pannello ISAG * CAVALLO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cavallo | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Profilo genetico pannello ISAG * GATTO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Profilo genetico pannello ISAG 2008 * CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| PROFILO PRE-CHIRURGICO: CANE Emo + Bio ridotto + Coag ridotto | Profili | | Cane | | 1 ml sangue $K_3$EDTA + 0.3 ml siero + 0.3 ml plasma da sodio citrato | in giornata | |
| PROFILO PRE-CHIRURGICO: GATTO Emo + | Profili | | Gatto | | 1 ml sangue | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio ridotto + Coag ridotto | | | | | $K_3$EDTA + 0.3 ml siero + 0.3 ml plasma da sodio citrato | | |
| Profilo sideremico (Fe-UIBC-TIBC-Ferritina) | Biochimica Clinica | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Profilo sideremico (Gatto) | Biochimica Clinica | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Progesterone (metodo immunologico) | Endocrinologia | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Propoxur | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Proteina C reattiva | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Coniglio, Furetto, Pecora, Scimmia | | 0.3 ml | in giornata | |
| Proteine Totali | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Proteine Totali del Liquor | Biochimica Clinica | liquor | Cane, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Proteine urinarie (quantitativo) | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Prove di compatibilità su gel in colonna (prova Major) a temperatura ambiente | Referto Generico | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 1 ml | in giornata | |
| Prove di compatibilità valutazione microscopica | Referto Generico | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 1 ml | in giornata | |
| PT | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT + APTT | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| PT/Creatinina urinaria (PU/CU) | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| PTH (siero) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| **Q** | | | | | | | |
| Quantificazione del rame da biopsia epatica (a secco e deposta in provetta) * | Referto Generico | biopsia a fresco | Cane | | biopsia a fresco in provetta vuota | 7 giorni lavorativi | eseguito in service |
| **R** | | | | | | | |
| Rapporto Ac. Urico urinario/CU | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Rapporto Amilasi/Creatinina | Urine | Urine | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| Reticolociti GATTO con nuovo blu di Metilene | Ematologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| REUMA test * | Immunologia | Siero | Cane | | 0.3 ml | 5 giorni lavorativi | eseguito in service |
| Ricerca anticorpi anti recettore dell'acetilcolina *(Myasthenia gravis) CANE | Immunologia | Siero | Cane | | 1 ml | 3 settimane | eseguito in service |
| Ricerca anticorpi anti recettore dell'acetilcolina *(Myasthenia gravis) GATTO | Immunologia | Siero | Gatto | | 1 ml | 3 settimane | eseguito in service |
| Ricerca anticorpi contro le fibre 2M *(Miosite dei muscoli masticatori) CANE | Immunologia | Siero | Cane | | 1 ml | 3 settimane | eseguito in service |
| Ricerca anticorpi contro le fibre 2M *(Miosite dei muscoli masticatori) GATTO | Immunologia | Siero | Gatto | | 1 ml | 3 settimane | eseguito in service |
| Ricerca inibitori | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Rickettsia IgG (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.2 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickettsia IgG e IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.2 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Rickettsia IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane | | 0.2 ml | si esegue il martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Rickettsia spp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Rodenticidi cumarinici (qualitativo) | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | anche da siero 0.4 ml |
| Rodenticidi Cumarinici completo con Quantificazione | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | anche da siero 0.4 ml |
| Rodenticidi Cumarinici completo con Quantificazione Accreditato (sangue in $K_3$EDTA) | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane |  | 0.4 ml | in 48 ore | |
| Rodenticidi Cumarinici Quantificazione aggiuntiva (richiedere previa positività rilevata ai rodenticidi o in corso di monitoraggio*) | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cavallo, Gatto | | 0.4 ml | in 48 ore | |
| Rodenticidi Cumarinici Quantificazione aggiuntiva Accreditato (sangue in $K_3$EDTA) | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane |  | 0.4 ml | in 48 ore | |
| **S** | | | | | | | |
| SAA | Biochimica Clinica | Siero | Asino, Cavallo, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| SAA EQUINA | Biochimica Clinica | Siero | Cavallo | | 0.3 ml | in giornata | |
| Sangue occulto (cane) | Coprologico | Feci | Cane | | 4 gr | in giornata | |
| Sangue occulto (gatto) * | Coprologico | Feci | Gatto | | 4 gr | in 5 giorni lavorativi | eseguito in service |
| Sarcoptes scabiei IgG (ELISA) * | Sierologico | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 7 giorni | eseguito in service |
| SDMA (Dimetilarginina Simmetrica) Accreditato | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Gatto |  | 0.5 ml | in 72 ore | |
| SDS-AGE | Elettroforesi | Urine | Cane, | | 1 ml | si esegue il | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Urinaria | | Gatto | | | venerdi | |
| Sensibilità all'Ivermectina (difetto del gene MDR1) | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 5 giorni | |
| Sessaggio specie aviarie * | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Aviarie, Pappagallo | | 0.5 ml o penne a fresco | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Severe Combined Immune-deficiency (SCID) * | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Sindrome da caduta improvvisa Episodic Falling - EF * Cavalier King Charles Spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Sindrome del collasso indotto da esercizio EIC (Exercise Induced Collapse) * Labrador | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Sindrome della Miastenia congenita (CMS) * Devon rex, Sphynx | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Sindrome di Bernard-Soulier * Cocker spaniel | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Sindrome di Fanconi * Basenji | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Sindrome di Musladin-Lueke (MLS) * Beagle | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Sindrome di Van den Ende Gupta * Fox Terrier | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Singola colorazione speciale (da richiedere dopo esame istopatologico) | Istopatologia | | Cane, Gatto | | | 5 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Singola colorazione speciale (da richiedere dopo esame istopatologico) | Istopatologia Cutanea | | Cane, Gatto | | | 5 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Sodio | Biochimica | Siero | Cane, | | 0.3 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clinica | | Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | | | |
| Sodio urinario | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Spinal Dysraphism/Neural Tube Defects (NTD) Weimaraner * | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Spongy Degeneration With Cerebellar Ataxia SDCA1 * Belgian Shepherd | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Spongy Degeneration With Cerebellar Ataxia SDCA2 * Belgian Shepherd) | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Startle Disease * Irish Wolfshound | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Stricnina | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| **T** | | | | | | | |
| Taurina da plasma in $K_3$EDTA o litio eparina Accreditato | Biochimica Clinica | Plasma in $K_3$EDTA | Cane, Gatto |  | 0.5 ml di plasma $K_3$EDTA o litio eparina | 5 giorni | |
| Taurina da sangue intero in $K_3$EDTA Accreditato | Biochimica Clinica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto |  | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Tempo di trombina (CANE) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Cane | | 0.3 ml | in giornata | |
| Tempo di trombina (GATTO) | Profilo Emostatico | Plasma da Sodio Citrato | Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Test alimentare Nextmune PAX * | Immunologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | 15 giorni | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test alimentare Nextmune PAX equino * | Immunologia | Siero | Cavallo | | 0.5 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test ambientale e alimentare Nextmune NEXT+ equino * | Immunologia | Siero | Cavallo | | 1 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test ambientale e alimentare Nextmune PAX * | Immunologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test ambientale e alimentare Nextmune PAX equino * | Immunologia | Siero | Cavallo | | 0.5 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test ambientale Nextmune NEXT+ * | Immunologia | Siero | Cane, Gatto | | 1 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test ambientale Nextmune PAX * | Immunologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test ambientale nextmune PAX equino * | Immunologia | Siero | Cavallo | | 0.5 ml | 15 giorni | eseguito in service |
| Test di autoagglutinazione | Immunologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| TEST DI KNOTT | Referto Generico | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane, Gatto | | 1 ml | in giornata | |
| Test di paternità * CANE | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Test di paternità * CANE ENCI | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Test di paternità * CAVALLO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cavallo | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Test di paternità * GATTO | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 3-4 settimane | eseguito in service |
| Test di stimolazione con desmopressina (ACTH da plasma) Accreditato | Endocrinologia | Plasma da sangue intero in $K_3$EDTA addizionato con aprotinina e | Cane |  | 0.3 ml plasma x 4 e 0.3 ml siero x 4 | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | siero | | | | | |
| Testosterone LC-MS-MS Gatto (Maschio Castrato Adulto) | Endocrinologia | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Testosterone LC-MS-MS Gatto (Maschio Intero Adulto) | Endocrinologia | Siero | Gatto | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Testosterone basale e post-stimolazione (tre determinazioni) (LC-MS-MS) | Endocrinologia | Siero | Cavallo | | 0.5 ml x 3 | in 72 ore | |
| Testosterone e testosterone post stimolazione (due determinazioni) (LC-MS-MS) | Endocrinologia | Siero | Cavallo, Gatto | | 0.5 ml x 2 | in 72 ore | |
| Testosterone e testosterone post stimolazione LC-MS-MS (Femmina-Castrata-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml x 2 | in 72 ore | |
| Testosterone e testosterone post stimolazione LC-MS-MS (Femmina-Intera-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml x 2 | in 72 ore | |
| Testosterone e testosterone post stimolazione LC-MS-MS (Maschio-Castrato-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml x 2 | in 72 ore | |
| Testosterone e testosterone post stimolazione LC-MS-MS (Maschio-Intero-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml x 2 | in 72 ore | |
| Testosterone LC-MS-MS | Endocrinologia | Siero | Cavallo | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Testosterone LC-MS-MS (Femmina-Castrata-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Testosterone LC-MS-MS (Femmina-Intera-Adulta) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Testosterone LC-MS-MS (Maschio-Castrato-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Testosterone LC-MS-MS (Maschio-Intero-Adulto) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in 72 ore | |
| Tetramethrin | Tossicologia | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | |
| Theileria equi/Babesia caballi | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cavallo | | | 2-5 giorni | |
| Tipizzazione molecolare gruppi sanguigni * GATTO | Genetica | Sangue intero in $K_3EDTA$ | Gatto | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Titolo anticorpale per sensibilità al glutine CANE (siero refrigerato ed al riparo dalla luce) * | Immunologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | 10 giorni | al riparo dalla luce |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo anticorpale protettivo per cimurro, parvovirosi e epatite infettiva | Immunologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | eseguito il lunedi | refertazione in 24 ore |
| Titolo anticorpale protettivo per parvovirosi, herpesvirosi e calicivirosi | Immunologia | Siero | Gatto | | 0.5 ml | eseguito il lunedi | refertazione in 24 ore |
| TLI * | Biochimica Clinica | Siero | Gatto | | 1 ml | in 20 giorni | eseguito (GI Lab, U. of Texas, USA) |
| TLI canino | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| TLI, Cobalamina (B12) e Folati (cane) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.8 ml | in giornata | |
| TLI, Cobalamina (B12), Folati e Citrullina (CANE) Accreditato | Endocrinologia | Siero | Cane | | 1 ml | in 72 ore | |
| Toxoplasma gondii | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Furetto, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| Toxoplasma IgG (IFI) | Sierologico | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Toxoplasma IgG e IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Toxoplasma IgM (IFI) | Sierologico | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | martedì e giovedì | refertazione in 72 ore |
| Trapped Neutrophil Syndrome * Border Collie | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Trigliceridi | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Tritrichomonas foetus | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Gatto, Pappagallo | | | 2-5 giorni | |
| Trombopatia * Basset Hound | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Trombopatia * Eskimo Spitz | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi | 2-3 settimane | eseguito in service |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | buccali | | |
| Trombopatia * Landseer | Genetica | Sangue intero in $K_3$EDTA | Cane | | 0.5 ml o 2 tamponi buccali | 2-3 settimane | eseguito in service |
| Troponina cardiaca | Endocrinologia | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| TSH | Endocrinologia | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| TSH | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.2 ml | in giornata | |
| TT4 | Endocrinologia | Siero | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| TT4 | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| TT4 - TT4 post TRH (due determinazioni) | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml x 2 | in giornata | |
| TT4 - TSH | Endocrinologia | Siero | Cane | | 0.5 ml | in giornata | |
| TT4 - TSH | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| TT4 (doppia determinazione per terapia) | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto | | 0.5 ml x 2 | in giornata | |
| **U** | | | | | | | |
| Urea | Biochimica Clinica | Siero | Cane, Cavallo, Coniglio, Furetto, Gatto | | 0.3 ml | in giornata | |
| Urea urinaria | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 0.5 ml | in giornata | |
| Urine, con sedimento e peso specifico (rifrattometrico) incluso | Urine | Urine | Cane, Cavallo, Gatto | | 7 ml | in giornata | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urinocoltura (acido borico: esame colturale classico con carica microbica) | Colturale | Urina | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | 4 ml di urina in provetta con acido borico | 2-3 giorni | |
| **V** | | | | | | | |
| Valutazione dei margini | Istopatologia | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Valutazione dei margini | Istopatologia Cutanea | | Cane, Cavallo, Gatto e altre specie | | | 7 giorni lavorativi | richiesta aggiuntiva |
| Vitamina D (25OHD3) | Biochimica Clinica | Siero | Cane | | 0.3 ml | 3-5 giorni | |
| **W** | | | | | | | |
| Warfarin | Tossicologia | Sangue intero in $K_3$EDTA | Aviarie, Cane, Gatto | | 0.2 ml | in 48 ore | anche da siero 0.2 ml |
| Wolbachia sp | Biologia Molecolare | Vedi tabella | Cane, Gatto | | | 2-5 giorni | |
| **Z** | | | | | | | |
| Zonisamide (LC-MS-MS) Accreditato | Monitoraggio Terapeutico | Siero | Cane, Gatto |  | 0.3 ml | in 72 ore | |